



- ★三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所
- ★三八畜産衛生協議会


みつばち用医薬品の使用基準を守り、正しく使いましょう。

昨年の9月にアメリカ腐蛆病の新たな予防薬としてタイラン水溶散が承認されました。今年の採蜜に向けた蜂群管理の際は、みつばち用医薬品について適正使用の徹底をお願いします。

現在みつばちに使用できる医薬品

薬剤名（有効成分）	適応症	使用期間	使用禁止期間
タイラン水溶散 （タイロシン） ※国内認可はエランコ ジャパン（株）製のみ	アメリカ 腐蛆病	週1回を 3週間	食用に供するはちみつ 及びその他の生産物の 生産前28日間
みつばち用アピテン （ミロサマイシン）		7日間	食用に供するはちみつ 及びその他の生産物の 生産前14日間
日農アピスタン （フルバリネート）	バロア病	6週間 以内	食用に供するはちみつ 及びその他の生産物を 生産している期間
アピバール （アミトラズ）			

（例）使用禁止期間が「食用に供するはちみつ及びその他の生産物の生産前14日間」である医薬品を3月11日から3月17日までの7日間使用した場合、出荷できるのは4月1日からとなります。




タイラン水溶散の概要

—アメリカ腐蛆病の新予防薬について—

タイラン水溶散とは

みつばち用アピテンの国内における製造中止を受け、アメリカ腐蛆病予防薬として新たに承認された抗菌剤です。用法用量や休薬期間等がアピテンと異なりますので、十分理解した上で正しく使用してください。

用法と用量



①タイラン水溶散200mgと粉砂糖20gをよく混合する。

②混合した粉末を育児箱の上から週1回、3週間散布投与する。

《使用上の注意事項》

- ・本剤は集蜜前の早春又は集蜜終了後の秋に使用し、集蜜期には使用しないこと。
- ・本剤は効能・効果において定められた適応症(アメリカ腐蛆病)の予防にのみ使用すること。
- ・本剤投与期間中に蓄えられたはちみつ、ローヤルゼリー中には抗生物質が残留しているため、食用としないこと。
- ・本剤は治療薬ではないため、アメリカ腐蛆病を疑う場合はただちに家畜保健衛生所へ通報すること。

ご質問等、お問い合わせは

三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所

TEL: 0178-27-7415 FAX: 0178-27-7418