




令和4年 東青りんご情報 第3号

令和4年5月24日発行 東青農業普及振興室

生育ステージ (月/日)

5月1日～22日気象 (黒石アメダス)

地点	品種	年	発芽日	展葉日	開花日	満開日	落花日
青森市 浪岡 北中野	ふじ	本年	4/8	4/12	5/2	5/7	5/11
		平年	4/9	4/19	5/9	5/13	5/18
		前年	4/1	4/11	5/5	5/10	5/15
		平年比	1日早	7日早	7日早	6日早	7日早
	つがる	本年	4/9	4/13	5/3	5/7	5/11
		平年	4/9	4/22	5/9	5/14	5/19
		前年	4/1	4/13	5/6	5/11	5/16
		平年比	並	9日早	6日早	7日早	8日早
	王林	本年	4/7	4/12	4/27	5/4	5/10
平年		4/7	4/17	5/7	5/11	5/16	
前年		3/30	4/7	5/2	5/6	5/12	
	平年比	並	5日早	10日早	7日早	6日早	
青森市 田茂木野	ふじ	本年	4/9	4/13	5/4	5/9	5/13
		平年	4/11	4/21	5/11	5/15	5/21
		前年	4/2	4/12	5/7	5/11	5/17
		平年比	2日早	8日早	7日早	6日早	8日早
	つがる	本年	4/9	4/13	5/4	5/9	5/13
		平年	4/10	4/23	5/10	5/15	5/20
前年		4/2	4/15	5/6	5/12	5/17	
	平年比	1日早	10日早	6日早	6日早	7日早	
黒石市 りんご研	ふじ	本年	4/6	4/12	4/29	5/6	5/9
		平年	4/7	4/18	5/7	5/12	5/16
		前年	3/30	4/7	5/3	5/8	5/13
		平年比	1日早	6日早	8日早	6日早	7日早
	つがる	本年	4/6	4/12	4/29	5/6	5/10
		平年	4/6	4/19	5/7	5/12	5/17
		前年	3/29	4/8	5/4	5/9	5/14
		平年比	並	7日早	8日早	6日早	7日早
	王林	本年	4/4	4/11	4/27	5/4	5/7
平年		4/6	4/16	5/5	5/11	5/15	
前年		3/29	4/4	4/28	5/6	5/10	
	平年比	2日早	5日早	8日早	7日早	8日早	



※平年値：浪岡北中野のふじは平成13年～令和3年の平均値、つがるは平成17年～令和3年の平均値、
王林は平成18年～令和3年の平均値。
田茂木野のふじ・つがるは令和4年から調査場所変更のため参考値（平成8～令和3年の平均値）。
りんご研究所は平成14年～令和3年の平均値。

【概況】

5月1～22日の平均気温は、青森が1.0℃、黒石が1.7℃平年より高かった。降水量は、平年比で青森が30%、黒石は34%と少なかった。日照時間は、平年比で青森が133%、黒石は130%であった。

本年のふじの満開日は、浪岡で5月7日、田茂木野で5月9日と平年より6日早かった。ふじの落花日は、浪岡で5月11日、田茂木野で5月13日と平年より7～8日早かった。

1 作業の進捗状況

- ・ふじの開花直後の薬剤散布は、5月10～12日頃が盛期であった。
- ・ふじ等の一つなり摘果や草刈り等が行われている。

2 今後の作業

- ・「ふじの落花20日後頃」までは黒星病の重点防除時期なので、薬剤散布は10日間隔を遵守し、基準量を丁寧に散布する。なお、散布予定日に降雨が見込まれる場合は、事前散布する。
- ・高品質大玉生産に向け、果実形質を見極めながら一つなり摘果をできるだけ早く行う。
- ・ふじのつる割れの発生が多い園地では、ヒオモン水溶剤の利用を検討する（散布時期：満開20～25日後）。その場合、摘果剤は使用できないため注意すること。

自園地の状況に合わせて適期防除を実施しよう！
薬剤散布は基準量を丁寧に散布！
良果を見極め早めの摘果を！

農作業安全運動展開中！（～5月31日）
～ みんなで声かけ！！安全確認 ～