



ゴールデンウィーク

## GWにおける豚熱・アフリカ豚熱等への 防疫対策を徹底しましょう

### 豚熱(CSF)について

現在国内の多くの地域ではワクチン接種が行われているが、ワクチン接種農場でも発生が続発しており、侵入リスクが高い状態が続いています。

### アフリカ豚熱(ASF)について

マレーシアで今年初めて発生が確認された他、中国、モンゴル、ベトナム、香港、韓国、フィリピン等の多くのアジア地域で発生が確認されています。

ASF等のワクチンが実用化されていない家畜伝染病のことを念頭に置くと、発生予防対策に万全を期すことが不可欠です。

ゴールデンウィークを迎えるにあたり、**飼養衛生管理基準を遵守し、防疫対策を引き続き徹底**してください。

## 農場を守るために

- ① 海外渡航の自粛
- ② 病原体の持ち込みの防止



看板の設置等により、必要のない者を衛生管理区域や畜舎に立ち入らせないようにすること。

また、不要な物を持ち込まないこと。

衛生管理区域もしくは畜舎に立ち入る場合、又は物を持ち込む場合には、手指の消毒、専用靴の着用、物品の消毒等を行うこと。

野生動物や野鳥を、衛生管理区域や飼料保管場所に入れないようにすること。  
(防護柵の設置、防鳥ネットの設置、周辺の除草 など)

- ③ 毎日の健康観察
- ④ 異常の早期発見・早期通報

# CSF (豚熱)

2018年9月以降  
国内続発中

耳翼・四肢  
の紫斑

または

同一豚房(豚舎)内で

- ・40度以上の高温
  - ・便秘下痢、血便
  - ・結膜炎(めやに)
  - ・歩行困難、後躯麻痺、
  - ・ひね豚
  - ・流死産
  - ・皮下出血、紅斑
- を呈した豚の増加が見られる



元気がない



結膜炎

耳翼の紫斑

重症例は後躯麻痺・運動失調・四肢の激しいけいれんなどの神経症状・皮下出血による紫斑(尾翼・尾・腹部・内股部)を呈し死亡


写真出典：岐阜県

# ASF (アフリカ豚熱)

アジア諸国で発生確認



死亡



チアノーゼ

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性では突然死亡、急性では発熱(40~42℃)、皮下出血、脾臓の腫大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近い。

写真出典：国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

# FMD (口蹄疫)

39℃以上の発熱

と

- ・泡状のよだれ
- ・歩き方がおかしい
- ・起立できない
- ・泌乳停止あるいは乳量の大幅減少

いずれかの  
症状を示し


口の中、唇、鼻、蹄、乳房の  
いずれかに  
水疱、びらん、潰瘍  
または痂痕がみられる。



蹄球部皮膚のびらん、潰瘍



鼻端の水疱



鼻平面の潰瘍



乳房、乳頭の水疱、  
びらん、痂皮

このような症状を呈している家畜を発見した場合は、  
直ちにむつ家畜保健衛生所に連絡してください！

下北地域県民局地域農林水産部 むつ家畜保健衛生所

TEL: **0175-22-1254**

FAX: 0175-22-1259

夜間・土日祝祭日の場合 家保携帯: **090-5841-6810**



ゴールデンウィーク

## GWにおける家畜伝染病の防疫対策を徹底しましょう

### 口蹄疫について

平成22年度以降、我が国においては発生が確認されておりませんが、東アジアやロシアにおいて発生が継続しています。2022年は、中国で2件の発生が確認されています。

ゴールデンウィークを迎えるにあたり、飼養衛生管理基準を遵守し、**防疫対策を引き続き徹底**してください。

### 農場を守るために

#### ① 海外渡航の自粛


#### ② 病原体の持ち込みの防止

看板の設置等により、必要のない者を衛生管理区域や畜舎に立ち入らせないようにすること。また、不要な物を持ち込まないこと。

衛生管理区域もしくは畜舎に立ち入る場合、又は物を持ち込む場合には、手指の消毒、専用靴の着用、物品の消毒等を行うこと。

野生動物や野鳥を、畜舎や飼料保管場所に入れないようにすること。

(防鳥ネットの設置、周辺の除草、餌の蓋付き保管 など)



#### ③ 毎日の健康観察

#### ④ 異常の早期発見・早期通報

# 口蹄疫を疑う症状を発見した際のお願い！

## 口蹄疫の『特定症状』※

口蹄疫を疑う次の1～3のいずれかの症状を発見した際は、  
**直ちに当所へ連絡してください**

1

39℃以上の発熱

と

- ・泡状のよだれ
- ・歩き方がおかしい
- ・起立できない
- ・泌乳停止あるいは乳量の大幅減少

いずれかの  
症状を示し

口の中、唇、鼻、蹄、乳房のいずれかに  
水疱、びらん、潰瘍  
または癒痕がみられる。



泡状のよだれ



口蓋のびらん



舌の水疱



乳頭の水疱

2

同じ畜房(畜舎)内の、複数の家畜の口内(又は鼻・蹄・乳房など)に、水疱等ができている場合。

3

(群飼の場合): 同じ畜房内の半分以上の  
(単房の場合): 隣り合った畜房で、複数の

哺乳畜が2日以内に死亡

※特定症状とは？

農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状のことで、偶蹄類(牛・水牛・めん羊・山羊・豚・いのしし)では口蹄疫が指定されています。

**このような症状を呈している家畜を発見した場合は、  
直ちにむつ家畜保健衛生所に連絡してください！**

下北地域県民局地域農林水産部 むつ家畜保健衛生所

TEL: **0175-22-1254**

FAX: 0175-22-1259

夜間・土日祝祭日の場合 家保携帯: **090-5841-6810**



ゴールデンウィーク

## GWにおける高病原性鳥インフルエンザ等への防疫対策を徹底しましょう

### 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)について

今シーズン、12道県・23例の発生が確認され、県内でも3例の発生が確認されました。野鳥や野生哺乳類でも感染が確認されており、感染リスクは極めて高く、予断を許さない状況が続いています。

ゴールデンウィークを迎えるにあたり、飼養衛生管理基準を遵守し、**防疫対策を引き続き徹底**してください。

### 農場を守るために

#### ① 海外渡航の自粛

#### ② 病原体の持ち込みの防止

看板の設置等により、必要のない者を衛生管理区域や畜舎に立ち入らせないようにすること。

立入り記録を確認すること。

鶏飼養に不要な物を持ち込まないこと。

衛生管理区域もしくは畜舎に立ち入る場合、又は物を持ち込む場合には、手指の消毒、専用靴の着用、物品の消毒等を行うこと。

野生動物や野鳥を、衛生管理区域や飼料保管場所に入れないようにすること。

(壁の補修、防鳥ネットの設置・補修、周辺の除草 など)



#### ③ 毎日の健康観察

#### ④ 異常の早期発見・早期通報

# 高病原性鳥インフルエンザを疑う症状が見られたら 速やかに家畜保健衛生所へ！

## HPAI(高病原性鳥インフルエンザ)を疑う症状

- ・急激に死亡する鶏の数が増えた
- ・過去3週間の死亡率と比べて、死亡率が2倍以上になった
- ・5羽以上まとまって死亡している
- ・まとまって嗜眠・沈うつ状態になっている(写真1・2)
- ・皮下出血がある(写真3)
- ・トサカや肉垂が暗青色に変化した(写真4)
- ・急激に産卵率が低下した



写真1. 感染し、元気をなくした鶏(真瀬昌司原画)



写真3. 脚部の皮下出血(真瀬昌司・谷村信彦原画)



写真2. 突然の沈うつ、すぐ死亡(山口県提供)



写真4. 宮崎株実験鳥 肉垂のチアノーゼが見られる  
(動物衛生研究所提供)

このような症状を呈している家畜を発見した場合は、  
直ちにむつ家畜保健衛生所に連絡してください！

下北地域県民局地域農林水産部 むつ家畜保健衛生所

TEL: **0175-22-1254**

FAX: 0175-22-1259

夜間・土日祝祭日の場合 家保携帯: **090-5841-6810**