

# 十和田火山災害想定影響範囲図

十和田火山は、日本の歴史上最大の噴火をした活火山です。気象庁では、国内に50ある「常時観測火山」の一つとして、24時間体制で監視・観測を行っています。今は、静かに見えますが、十和田火山は、将来必ず噴火します。

十和田火山はどんな火山でしょうか？十和田火山には、大きなカルデラがあります。“カルデラ”とは、火山の大噴火によってへこんだ、直径約2km以上のくぼ地のことをいいます。この中に水がたまってできたのが、十和田湖です。しかも、内側には中湖（なかのうみ）カルデラがある二重カルデラです。


この冊子では、将来十和田火山が噴火した場合にどのようなことが起きるのかを説明します。想定噴火をもとに、噴火の影響がおよび、災害が発生する可能性のある場所を示したハザードマップを紹介します。

十和田湖には、すばらしい自然とその恵みがあります。十和田湖は大きなエネルギーを秘めた活火山でもあります。将来の噴火に備え、火山としての十和田湖を知っていただければと思います。

## 【もくじ】

- ◎ 火山噴火と噴火のときに起きる現象 p.2
- ◎ 十和田火山のなりたちと過去の噴火 p.3
- ◎ 最近11,000年間の火山活動 p.4
- ◎ 平安時代（西暦915年）に起きた大規模噴火 p.5
- ◎ 特徴的な噴火（軽石噴火と溶岩ドームを作った噴火） p.6
- ◎ 将来噴火する可能性がある場所と噴火の大きさの想定 p.7
- ◎ 大きさの異なる3種類の噴火で考えられる現象と推移 p.8

## 十和田火山の地形



国土地理院電子国土基本図に赤色立体地図(淡色表現)を重ねて作成しています。  
地図上の「御門石」は、「みかどいし」など別の読みをすることがあります。この冊子では「ごもんいし」と記しています。


- ◆ 赤色立体地図とは  
赤色立体地図は、急傾斜ほど赤く、尾根ほど明るく、谷ほど暗く色づけすることで、特殊な器具や訓練を必要とせずに、これまで難しかった自然な立体感を得られる地形表現手法です。



# 火山噴火と噴火のときに起きる現象


噴火には色々なタイプがあります。十和田火山で起こる可能性のある噴火現象を紹介します。

どんな噴火があるの？



**水蒸気噴火**

マグマの熱によってあたためられた地下水が一気に沸騰し、周囲の岩石を吹き飛ばす爆発現象です。西暦2014年の御嶽山噴火がその代表例です。



**マグマ水蒸気噴火**

上昇してきたマグマが地下水にふれると爆発が起こります。これがマグマ水蒸気噴火です。



**マグマ噴火**

地下から上昇してきたマグマが、そのまま地表に噴き出す現象です。マグマの化学的な性質によって様々な噴火を起こします。

噴火すると、どのようなことが起きるの？

飛んでくる・降ってくる現象	流れてくる現象
<p><b>大きな噴石</b></p> <p>御嶽山（長野県・岐阜県）の例 小さな噴石による被害を含む</p> <p>写真提供：御嶽山総合観測班（火山噴火予知連絡会）</p>	<p><b>火碎流・火碎サージ</b></p> <p>三宅島（2000年）</p> <p>©千葉達朗</p>
<p><b>降下火碎物</b></p> <p>桜島（2013年）</p> <p>©アジア航測</p>	<p><b>溶岩流・溶岩ドーム</b></p> <p>雲仙普賢岳（1995年）</p> <p>©アジア航測</p>
<p><b>マグマ噴火</b></p> <p>マグマが火口から流れ出したものを溶岩流といいます。ねばりけの強いマグマは火口の上にそのまま盛り上り、溶岩ドームになります。溶岩ドームが熱いま崩れると、火碎流が発生することがあります。</p>	<p><b>融雪型火山泥流</b></p> <p>セントヘレンズ火山（1982年）</p> <p>USGS アメリカ地質調査所</p> <p>雪がたくさんある火山で、火碎流などが発生すると、その熱によって斜面の雪が融かされ大量の水ができる。この水が周辺の土砂や岩石をまきこんで流れだすと火山泥流になります。高速で遠くまで流れ、大規模な災害を引き起すことがあります。</p>


現象の解説は気象庁HPを参考に編集しました

# 十和田火山のなりたちと過去の噴火

十和田火山は、約20万年前から噴火を繰り返していました。

15,000年前には、現在の十和田カルデラの原形を作った巨大噴火が起きました。この噴火では、青森・秋田・岩手3県の広い範囲を高温の火碎流が襲い、一帯は見わたすかぎり土砂で埋まり、荒野になったと考えられます。このような壊滅的な巨大噴火が、十和田火山では61,000年前と36,000年前にも起きていたとされています。

## 15,000年前の巨大噴火（八戸火碎流）の影響範囲



\*<sup>1</sup>岩手県滝沢村教育委員会 (2000), \*<sup>2</sup>町田・新井(2003)に基づく

この火碎流の痕跡は、八戸市や青森市など広い範囲で見ることができます。

## 巨大噴火

十和田火山の15,000年前の噴火のような巨大噴火は、日本全体で1万年に一度ほど起こります。このような噴火では、大量のマグマが噴き出すことによって、カルデラができます。

北海道の洞爺カルデラや九州の阿蘇カルデラなどが有名です。



十和田全景 東側上空から (2008/3/23気象庁撮影)

出典：気象庁HPより




十和田八戸火碎流堆積物の地層が見える崖  
火碎流堆積物が10 m以上の厚さで堆積しています  
(十和田市半在池付近(左地図★地点)) .

写真の出典：\*<sup>3</sup>工藤 (2005)


## カルデラのできかた



噴火前の状態。地下にマグマだまりがあります。



噴火で火碎流が発生し、カルデラができる始め、どんどん地面が凹んでいきます。



カルデラの完成。火碎流の中の火山灰や軽石がカルデラの周りにたまります。

# 最近11,000年間の火山活動

巨大噴火は15,000年前を最後に起きていませんが、大きな噴火は何度も起きています。15,000年前の噴火のあと、湖の中に五色岩火山ができました。その後、何度か爆発的な噴火をして、現在の中湖のカルデラができたと考えられています。噴火のたびに、空高く立ち上がった噴煙から、広い範囲に火山灰や軽石が降りそぎました。高温で高速に流れ下る火砕流や地形を大きく変える溶岩流が何度も発生しています。

## 最近11,000年間の十和田火山の噴火

十和田火山は過去11,000年間に少なくとも8回の爆発的な噴火がありました  
(\*<sup>4</sup>Hayakawa(1985), \*<sup>5</sup>工藤・佐々木(2007)等)。噴火によって発生した現象は違いますが、1000年～3000年に1度のペースで噴火しています。


年代 (噴火の呼び名)	噴火様式 (矢印は噴火途中で様式が 変化したと考えられていることを表す)	発生したと考えられる現象				
		大きな 噴石	降下 火砕物	火砕流 火砕サージ	溶岩 ドーム	火山泥流・ 土石流
西暦915年 (噴火エピソードA)	マグマ噴火・マグマ水蒸気噴火 (泥流発生)					
2,800年前 (噴火エピソードB)	マグマ噴火→マグマ水蒸気噴火					
6,200年前 (噴火エピソードC)	マグマ噴火→マグマ水蒸気噴火					
7,600年前 (噴火エピソードD')	マグマ水蒸気噴火→マグマ噴火					
8,300年前 (噴火エピソードD)	マグマ噴火→マグマ水蒸気噴火					
9,300年前 (噴火エピソードE)	マグマ噴火→マグマ水蒸気噴火					
10,300年前 (噴火エピソードF)	マグマ噴火→マグマ水蒸気噴火?					
11,000年前 (噴火エピソードG)	マグマ噴火					
不明 (御門石)	マグマ噴火					

\* 年代値 : \*<sup>6</sup>産業技術総合研究所地質調査総合センター(編)(2017) 1万年噴火イベントデータ集(ver.2.3).

産総研地質調査総合センター(<https://gbank.gsj.jp/volcano/eruption/index.html>) 一部、\*<sup>7</sup>工藤(2008)による。  
噴火イベント名 : Hayakawa(1985)による分類。

## 長い歴史でみたときの十和田火山の活動（過去13万年間）

さらに古い時代までさかのぼると、噴火を繰り返した時期と静かな時期があったことがわかります。



## 十和田火山は活火山！


平安時代に起きた噴火のあと、十和田火山は噴火していません。しかし、気象庁では「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」を「活火山」としています。このため、1000年前に噴火した十和田火山は立派な活火山であり、今後も噴火すると考えられています。

次のページでは、十和田火山でもっと有名な平安時代の噴火のときに、どのようなことが起きたのかを紹介します。


# 平安時代(西暦915年)に起きた大規模噴火

最も新しい噴火は、平安時代(西暦915年)に起きました。日本の歴史上、最大の噴火です。噴煙が高く上がり、軽石が広い範囲に降り積もったほか、火砕流が約20km離れた場所まで達しました。近年、この噴火の始まりから終わりまでの様子が、地質調査や遺跡発掘等によって明らかになってきました。大規模な噴火が繰り返し発生し、火砕流堆積物や軽石、火山灰が大量に堆積した場所では、その後の雨により大規模な泥流が日本海まで流れたと考えられています。

火砕流・火砕サージが到達した範囲と火山灰などの積もった厚さ



噴火後の  
火山泥流  
は海まで流  
れました



[20世紀に起きた爆発的噴火] ピナツボ火山(フィリピン)



1991.6.12 アメリカ地質調査所 撮影

平安時代の十和田火山と似た大きな噴火が、西暦1991年にピナツボ火山で起きました。噴火で発生した火砕流は20km離れた場所まで流れて火山から30km以内の6万人が避難しました。噴火の後しばらくは大規模な泥流が発生し続けました。


平安時代の噴火のときに起きた「毛馬内火砕流」は十和田火山周辺を高温で流下したほか、その後発生した火山泥流が大湯川・米代川で大洪水を引き起こして沿岸の人家を埋没するなどの被害を引き起こしました (\*<sup>19</sup>平山・市川, 1966)。



遺跡(左地図★地点)で見つかった泥流堆積物 (\*<sup>20</sup>赤石, 1999)


# 特徴的な噴火（軽石噴火と溶岩ドームを作った噴火）

6,200年前と9,300年前の噴火はどちらも爆発的な噴火でしたが、**6,200年前**の方が大量のマグマを地上へ出した噴火でした。十和田湖に近い場所へ**軽石や火山灰が4mを超す厚さで降り積もりました**。ところが、十和田湖の近くでは狭い範囲にしか火山灰を降らせなかった**9,300年前の噴火**のときには、はるか**80kmも離れた太平洋岸でも火山灰が降り積もった**ことがわかっています。噴き出すマグマの量が多くても、噴火したときの上空の風の強さや向きが違うと、被害は小さくてすむ場合もあります。噴火の規模が小さくとも、被害が大きくなることもあります。



十和田火山で過去に起きた噴火は、爆発的に噴煙柱を高く上げる噴火ばかりではなく、**静かにゆっくりと溶岩を出す噴火**もありました。たとえば十和田湖の中央付近の半島の先端にある山：御倉山溶岩ドームは、7,600年前の噴火のときに、下図のAからDの順序でゆっくり成長したと考えられています (\*<sup>21</sup>工藤, 2010)。


7,600年前 御倉山溶岩ドーム形成のイメージ



# 将来噴火する可能性がある場所と噴火の大きさの想定

将来噴火する可能性がある範囲は、中湖※と御門石を結ぶ3.4kmを半径とする円と想定しています。※ 湖の最深部である水深325mの位置を噴出中心と設定。

想定する噴火場所（火口のできる範囲）



- ◆ 最近1万年間の噴火は、御倉山や御門石、中湖など、複数の場所で起きていますが、いずれも十和田カルデラの中で噴火しています。
- ◆ 十和田火山で起きたもっと新しい平安噴火（西暦915年）の火口は、中湖付近と考えられています。

想定する噴火の大きさ


## 大・中・小規模の3種類

噴火規模	大規模噴火	中規模噴火	小規模噴火
噴出量	数十億m <sup>3</sup>	数億m <sup>3</sup>	数百万m <sup>3</sup>
類似の噴火実績	6200年前 中摺軽石噴火 (噴火エピソードC)	西暦915年の噴火 (噴火エピソードA) では何回か噴火を繰り返した。 いくつかの噴火は1回あたりの噴出量が数億m <sup>3</sup> だった	西暦2014年の御嶽山噴火
発生現象	大きな噴石 降下火碎物 火碎流・火碎サージ	大きな噴石 降下火碎物 火碎流・火碎サージ	大きな噴石 降下火碎物 火口噴出型泥流
土砂移動現象		火山泥流・降灰後の土石流 融雪型火山泥流(積雪期のみ) など	

(参考) 十和田湖の水の量が約42億m<sup>3</sup>、東京ドーム1個が約100万m<sup>3</sup>です。  
1回の噴火で出る火山灰などの量がとても多いことがわかります。

## 十和田火山とほかの火山の噴火の大きさをくらべてみよう！


国内で過去に発生した主な噴火の大きさ



# 十和田火山の噴火で考えられる現象と推移


過去11,000年間に十和田火山で起きた噴火や最新の知見から考えられる、十和田火山で起きる可能性のある現象と発生した後の変化の想定です。図の左側が現在で、右側にいくにつれて火山活動が活発化して終息していくイメージで作成しました。

## 影響範囲を検討する現象の推移



# 小規模噴火 (数百万m<sup>3</sup>の水蒸気噴火を想定)

噴火と同時に弾道を描いて飛び散る大きな噴石や噴煙から落下する降下火碎物を想定しています。十和田火山では小規模噴火の実績は確認されていません。起きた場合には、中規模噴火や大規模噴火へと移っていくと考えられます。



## 大きな噴石

噴火によって火口から弾道を描いて岩石が飛び散る現象です。屋根を突き破るほどの威力があります。



## 降下火碎物

噴火によって空高くあがった噴煙から火山灰や火山レキなどが降ってきます。風に流されて遠くまで運ばれてから落ちてくことがあります。

## 桜島 (2013年)



## 御嶽山 (2014年)



# 中規模噴火

(数億m<sup>3</sup>規模のマグマ噴火を想定)

噴煙が上空に上がったあと、ある場所から崩れ落ちてなだれのように斜面を流れ広がる火碎流・火碎サージと、風に流された噴煙から軽石や火山灰が降ってくる降下火碎物の発生を想定しています。中規模噴火のあと、大規模噴火がおきることも考えられます。

## 火碎流・火碎サージ

青森県



## 噴火様式

マグマ水蒸気噴火  
またはマグマ噴火

## 想定する現象

火碎流・火碎サージ

## 想定した根拠、実績等

西暦915年の噴火（噴火エピソードA）で発生した火碎サージの分布実績（OYU-2bと呼ばれる堆積物）を参考に想定


## 火碎流・火碎サージ

高温の火山灰や軽石と火山ガスが、なだれのように火山の斜面を流れ下る現象を火碎流といいます。自動車よりも速く、破壊力が大きい、もっとも危険な火山現象です。




## 十和田火山で実際にあきた中規模噴火の痕跡

- 西暦915年の噴火では何回か噴火を繰り返したことが地層からわかります。
- 右写真の灰色の火山灰（火碎サージ堆積物）が中規模噴火だったと考えられます。
- 中湖から噴火して、南西～南方に流れ出したと考えられています。



大湯火碎堆積物の地層写真  
(出典: 広井・他, 2015)



<b>噴火様式</b>	マグマ水蒸気噴火 またはマグマ噴火
<b>想定する現象</b>	降下火碎物
<b>想定した 根拠、実績 等</b>	西暦915年の噴火（噴火エピソードA）で火碎物が降り積もった実績（OYU-1と呼ばれる堆積物）を参考に想定


## 降下火碎物

噴火によって空高くあがった噴煙から火山灰や軽石などが降ってきます。風に流されて遠くまで運ばれてから落ちてくることがあります。




## 十和田火山で実際にあきた 中規模噴火による降下火碎物の痕跡

下図の赤い線は西暦915年に起きた中規模噴火のときの軽石・火山灰が積もった範囲と厚さです。十和田湖から南西方向へ降り積もりました。青い線は2800年前の中規模噴火のときの範囲と厚さです。東方向へ降り積もりました。



- ◆ 十和田火山で過去におきた中規模噴火の実績を参考にして影響範囲を想定しました。
- ◆ 軽石や火山灰が厚さ30cm以上で積もる範囲は風下側で火口から約20km、厚さ10cm以上となる範囲は風下側で火口から約30kmの範囲です。
- ◆ 噴火のときの風の向き・速度によっても積もる厚さや距離は変化します。




西暦915年の噴火で降ってきた軽石の写真（出典：広井・他, 2015）

## シミュレーション条件12

噴火様式	マグマ水蒸気噴火またはマグマ噴火【積雪期】
想定する現象	融雪型火山泥流
想定した根拠、実績等	周辺観測所の実績積雪データと西暦915年(噴火エピソードA)で発生した火碎サージの分布実績(OYU-2bと呼ばれる堆積物)を参考に、泥流量をシミュレーションしました。

### 記号の色と意味

- 想定火口範囲 (赤い正方形)
- 火碎流・火碎サージの影響範囲 (オレンジ色の点線)
- 火山泥流の影響範囲 (ピンク色)



## 火山泥流

火山泥流は、様々な原因で発生します。火碎流などの高温の噴出物が雪を溶かしてできた水と噴出物とが混じり合って流れ出す融雪型火山泥流、噴出物により形成された土砂ダムが崩壊して生じる火山泥流など、いろいろな火山泥流があります。火山から遠く離れた地域でも、大きな被害が発生するため注意が必要です。

- 火碎流・火碎サージの影響範囲の積雪が熱で融けて泥流が流れ下ることを想定しています。
- 浅瀬石川、奥入瀬川、五戸川、馬淵川、大湯川、小坂川の6つの流域（上図の太青線で囲まれる範囲）から発生した泥流が流下する可能性がある場所を着色で示したものです。
- ここに示した以外の場所でも泥流の影響が生じる可能性があります。
- シミュレーションに使用した地形データは100m解像度であり、ダムや河川堤防などの構造物の効果は反映していません。

# 大規模噴火 (数十億m<sup>3</sup>規模のマグマ噴火を想定)

噴煙が上空に上がったあと、ある場所から崩れ落ちてなだれのように斜面を流れ広がる火碎流・火碎サージと、噴煙が風に流されながら軽石や火山灰を降らせる降下火碎物の発生を想定しています。



噴火様式	マグマ水蒸気噴火 またはマグマ噴火
想定する現象	火碎流・火碎サージ
想定した 根拠、実績 等	西暦915年の噴火（噴火エピソードA）のクライマックスのときに起きた火碎流・火碎サージ（毛馬内火碎流）の分布実績を参考に想定

## 火碎流・火碎サージ

高温の火山灰や軽石と火山ガスが、なだれのように火山の斜面を流れ下る現象を火碎流といいます。自動車よりも速く、破壊力が大きい、もっとも危険な火山現象です。




## けまない 毛馬内火碎流って どんな噴火だろう？


西暦915年の噴火の最後に起きた火碎流（毛馬内火碎流）は、十和田火山から全方位へ流れ下って周辺の谷を埋め、20kmをこえた遠方まで到達しました。北へ向かった流れは、尾根を越えて八甲田山地域でも確認されています。



毛馬内火碎流堆積物(KPF)の  
露頭写真 (出典: 広井・他, 2015)



噴火のときの風の向き・速度によって影響範囲は変わります。上空では1年を通じて西からの風が多いため、降下火碎物の影響は火口の東側の地域で高い可能性があります。




※ 可能性マップとは、ある火山現象が発生する可能性のある範囲を網羅的に描いた分布図をいいます。


◆ 降下火碎物による被害には、積もったときの厚さや重さを考えて注意すべきこと（家屋の倒壊など）と、降ってくる石や灰の大きさを考えて注意すべきこと（衝突、健康被害など）があります。

噴火様式	マグマ水蒸気噴火またはマグマ噴火
想定する現象	降下火碎物
想定した根拠、実績等	6200年前の噴火（噴火エピソードC）の降下火碎物（中摺軽石）の分布実績を参考に、シミュレーションして想定

## 降下火碎物

噴火によって空高くあがった噴煙から火山灰や軽石などが降ってきます。風に流されて遠くまで運ばれてから落ちてくることがあります。





噴火様式	マグマ水蒸気噴火 またはマグマ噴火【積雪期】
想定する現象	融雪型火山泥流
想定した根拠、実績等	周辺観測所の実績積雪データと西暦915年(噴火エピソードA)噴火時の毛馬内火碎流の到達範囲を参考に、泥流量をシミュレーションしました。

## 融雪型火山泥流

積雪期の噴火で高温の火碎流などが雪を融かして大量の水ができると、周辺の土砂や岩石を巻き込みながら高速で威力のある流れとして流れ下ります。

北海道の十勝岳が大正時代に噴火したときには、大量の泥流が噴火口から25km離れた街まで到達して一面を埋めるなど、国内の20世紀最大の火山災害となりました。



アメリカのセントヘレンズ火山が積雪期に噴火して泥流が流れ下ったときのようす。

- 火碎流・火碎サージの影響範囲の積雪が熱で融けて泥流が流れ下ることを想定しています。
- 泥流が集まって大きな流れとなる米代川、岩木川、奥入瀬川の3つの流域（上図の太青線で囲まれる範囲）について、泥流が氾濫する可能性がある場所をピンク色で示したものです。
- ここに示した以外の場所でも泥流の影響が生じる可能性があります。
- シミュレーションに使用した地形データは100m解像度であり、ダムや河川堤防などの構造物の効果は反映していません。



## 火山泥流、降灰後の土石流

雪がないときでも、噴火の後には雨のたびに泥流が流れ出して被害がおきます。

噴火で積もった火山灰や岩石が雨水や河川水などと混ざり、途中の土砂や流木を巻き込みながら、高速で破壊力のある泥流・土石流として流れ下り大きな被害をもたらします。

噴火が終息したあとも、何年も雨のたびに繰り返し発生したり、洪水を引き起こしたりします。

## [参考] ピナツボ火山 西暦1991年噴火後の火山泥流



西暦1991年6月に起きたピナツボ火山の噴火では、火碎流が火口から20km付近まで達した後、[雨季には大雨のたびに火山泥流（ラハール）](#)が発生して火口から40km付近まで達し、村を埋没させるなどして7万戸を超す建物が被害にありました。

→ 火山泥流（ラハール）による被害状況。ピナツボ山から北東約24kmにある村。

左図の火山泥流の影響範囲以外に、大量の火山灰が積もった場所の下流では、[豪雨のときに注意の必要な河川や渓流以外からも泥流が流れ出ることがあります](#)。県や市町村が発表する土砂災害ハザードマップや洪水ハザードマップなども参考にしてください。

## 引用・参考にした文献

(関係掲載ページ順)

- 岩手県滝沢村教育委員会 (2000) 岩手山の地質 -火山灰が語る噴火史-. 滝沢村文化財調査報告書, **32**, 234p.
- 町田 洋・新井房夫 (2003) 新編火山灰アトラス「日本列島とその周辺」. 東京大学出版会, 東京, 336p.
- 工藤 崇 (2005) 十和田地域の地質. 地域地質研究報告 (5万分の1地質図幅), 産総研地質調査総合センター, 79p.
- Hayakawa, Y. (1985) Pyroclastic Geology of Towada Volcano. BULLETIN OF THE EARTHQUAKE INSTITUTE UNIVERSITY OF TOKYO, **60**, 507-592.
- 工藤 崇・佐々木寿 (2007) 十和田火山後カルデラ期噴出物の高精度噴火史編年. 地学雑誌, **116**, 653-663.
- 産業技術総合研究所地質調査総合センター (編) (2017) 1万年噴火イベントデータ集 (ver.2.3). 産総研地質調査総合センター (<https://gbank.gsj.jp/volcano/eruption/index.html>) .
- 工藤 崇 (2008) 十和田火山, 噴火エピソードE 及びG 噴出物の放射性炭素年代. 火山, **53**, 193-199.
- 工藤 崇 (2023) 十和田火山の積算マグマ噴出量階段図, 地質調査研究報告, 第74巻, 第3号, 133-153.
- 工藤 崇・奥野 充・中村俊夫 (2003) 北八甲田火山群における最近6000年間の噴火活動史. 地質学雑誌, **109**, 151-165.
- 工藤 崇・奥野 充・大場 司・北出優樹・中村俊夫 (2000) 北八甲田火山群, 地獄沼起源の噴火堆積物-噴火様式・規模・年代-. 火山, **45**, 315-322.
- 宝田晋治・村岡洋文 (2004) 八甲田山地域の地質. 地域地質研究報告 (5万分の1地質図幅), 産総研地質調査総合センター, 86p.
- 広井良美・宮本 毅・田中倫久 (2015) 十和田火山平安噴火(噴火エピソードA)の噴出物層序及び噴火推移の再検討. 火山, **60**, 187-209.
- 内藤博夫 (1963) 秋田県鷹巣盆地の地形発達史. 地理学評論, **36**, 655-668.
- 内藤博夫 (1966) 秋田県米代川流域の第四紀火山碎屑物と段丘地形. 地理学評論, **39**, 463-484.
- 内藤博夫 (1970) 秋田県花輪盆地および大館盆地の地形発達史. 地理学評論, **43**, 594-606.
- 内藤博夫 (1977) 秋田県能代平野の段丘地形. 第四紀研究, **16**, 57-70.
- 小野映介・片岡香子・海津正倫・里口保文 (2012) 十和田火山AD915噴火後のラハールが及ぼした津軽平野中部の堆積環境への影響. 第四紀研究, **51**, 317-330.
- 片岡香子・長橋良隆・小野映介 (2015) 津軽平野岩木川下流域における複数起源のテフラの再堆積と混合. 第四紀研究, **54**, 21-29.
- 平山次郎・市川賢一 (1966) 1,000年前のシラス洪水～発掘された十和田湖伝説～. 地質ニュース, **140**, 10-28.
- 赤石和幸 (1999) 十和田火山, 毛馬内火碎流に伴う火山泥流堆積物中から平安時代の埋没家屋の発見. 地質学雑誌, **105**, 123-124.
- 工藤 崇 (2010) 十和田火山, 御倉山溶岩ドームの形成時期と噴火推移. 火山, **55**, 89-107.

連絡先: 青森県防災危機管理課 電話: 017-734-9181  
秋田県総合防災課 電話: 018-860-4562

監修: 十和田火山防災協議会

発行: 青森県防災危機管理課、秋田県総合防災課、鹿角市総務課、小坂町総務課

製作: アジア航測株式会社

資料提供 (敬称略・順不同): 千葉達朗, 御嶽山総合観測班(火山噴火予知連絡会), 原田美鈴, アメリカ地質調査所, アジア航測株式会社

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び基盤地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。(承認番号 平29情使、第1126号)

平成30年1月作成  
令和6年3月修正